

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。

生薬製剤

販売名:はとむぎヨクイニン錠

第3類医薬品



相談すること



使用上の注意

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
皮膚:発疹・発赤、かゆみ／消化器:胃部不快感
- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 いぼ、皮膚のあれ

【用法・用量】 1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠	3回
5歳以上15歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈注意〉小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】成人の1日量(12錠)中

ヨクイニンエキス1384.6mg(原生薬換算18000mg)、ヨクイニン末500mg
添加物:バレイショデンプン、乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸Mg、無水ケイ酸、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg

※錠剤の表面に見られる黒褐色の斑点は、ヨクイニンによるものです。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)ぬれた手で取り扱わないでください。(湿気により錠剤の品質が変わります。)(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

はぴねすくらぶ

ご注文・
お問い合わせ



0120-66-88-11

【 阪 本 漢 法 製 薬
お 客 様 相 談 室 】

☎06-6423-0565

(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)



PE, 金属

発 売 元	株式会社 はぴねすくらぶ 福岡市中央区大手門3-14-19
製造販売元	株式会社 阪本漢法製薬 兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

製造番号
使用期限

