

鎮痛人蔘順血散

本剤はリウマチ、神経痛に有効な、カンボウイ、ウヤク、ドッカツ、シソヨウ、ヨクイニン等を配合した、生薬の鎮痛剤です。生薬独特のおだやかな効き目で痛みをやわらげます。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って 医師又は薬剤師に相談すること

服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

慢性急性神経痛・リウマチ・全身諸関節の疼痛・顔面神経痛・座骨神経痛・
肋間神経痛・肩こり・腰痛

用法・用量

大人1回量1包(3g)を1日2回・15才以下10才までは大人の半量、10才以下は使用しない。いずれも朝食前と夜就寝前に白湯にて使用する。

成分・分量 (1日量6g中)

(日局)サンキライ末	0.4g	(日局)センナ末	0.3g
(日局)トウキ末	0.3g	(日局)ヨクイニン末	0.3g
(日局)センキュウ末	0.3g	(日局)ソウジュツ末	0.2g
(日局)カンゾウ末	0.3g	(日局)ニンジン末	0.2g
カンボウイ末	0.5g	(日局)炭酸水素ナトリウム	0.6g
オトギリソウ末	0.5g	ドッカツ末	0.3g
シソヨウ末	0.3g	ゴシツ末	0.3g
ウヤク末	0.3g	ショウブコン末	0.3g
ウイキョウ末	0.3g	ショウマ末	0.3g

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お客様相談窓口

熊本市中央区水前寺2丁目16-24

製造販売元：有限会社 **渡部晴光堂**

電話 096-383-0113

FAX 096-383-0599 (24時間受付)